



|               |                     |                      |                    | Quantités de larves pour 1,5 m <sup>3</sup> |                  |          |         |
|---------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------|----------|---------|
| 24/08/2026    | Lieu de prélèvement | Température -1m (°C) | Salinité * -1m (‰) | Petites                                     | Petites évoluées | Moyennes | Grosses |
| Seudre        | Coux                | 23,0                 | 35,0               | 120 ↘                                       | 0 ⇒              | 30 ↗     | 0 ⇒     |
|               | Centre du bassin    | 21,7                 | 34,2               | 210 ↘                                       | 0 ↘              | 0 ⇒      | 0 ⇒     |
| Charente      | La Moulière         | 22,6                 | 33,9               | 240 ↘                                       | 210 ↗            | 160 ↗    | 0 ⇒     |
|               | Fouras              | 22,2                 | 34,3               | 3 210 ↗                                     | 330 ↗            | 0 ⇒      | 0 ⇒     |
| Nord Charente | Ré Ste Marie        | 21,9                 | 34,3               | 2 800 ↗                                     | 400 ↗            | 0 ↘      | 0 ⇒     |
|               | Ré Loix             | 21,3                 | 34,2               | 450 ↘                                       | 0 ⇒              | 100 ↗    | 0 ↘     |
|               | Digolet (Marsilly)  | 23,0                 | 34,9               | 3 570 ↗                                     | 90 ↗             | 0 ↘      | 0 ⇒     |
| Moyenne       |                     | 22,2                 | 34,4               | 1 514                                       | 147              | 41       | 0       |

\* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.


Les flèches ↗↘⇒ : évolution depuis le prélèvement précédent.

Appréciation des quantités de larves

Faible Moyenne Forte

## Évolution de la température et de la salinité de l'eau

Temp. °C et Salinité ‰



Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (mg/l, ou ‰) comparées aux références : moyenne de 2005 à 2025 (source : suivi des larves, Creaa / CAPENA).

La salinité moyenne (34,4‰) est supérieure de +0,7‰ à la normale de saison.

La température moyenne de l'eau est de 22,2°C, supérieure à la normale de saison de +0,4°C.

## Commentaires : Les stades larvaires

### Seudre : Coux

- ⇒ Faibles quantités de Petites et Moyennes ;

### Centre du bassin : Mérignac





- ⇒ Faible quantité de Petites ;

### Embouchure de La Charente

- ⇒ Moulière
  - Faibles quantités de Petites, Petites évoluées et Moyennes ;
- ⇒ Fouras :
  - Quantités modérées de Petites et Petites évoluées ;

### Nord Charente

- ⇒ Sainte-Marie,
  - Faible quantité de Petites ;
  - Quantité modérée de Petites évoluées ;
- ⇒ Loix
  - Faibles quantités de Petites et Moyennes ;
- ⇒ Digolet
  - Quantité modérée de Petites ;
  - Faible quantité de Petites évoluées.



Bouquet Anne Lise – al.bouquet@cape-na.fr  
CAPENA – Expertise et Application  
05 46 47 49 52 – <https://www.cape-na.fr>

Prochains prélèvements le 27 Août 2026.

Données sur <https://www.cape-na.fr>

et sur le site Velyger  
<https://velyger.ifremer.fr/Access-aux-donnees2>

Ainsi que sur le site du CRC 17.