



Prélèvement du 11 mai 2022 - PM + 2h : 16h28


Date	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité * -1m (‰)	Quantités de larves pour 1,5 m ³					
				Petites (<0,11 mm)	Nb moyen**	Moyennes (0,11 à 0,2 mm)	Nb moyen**	Grosses (> 0,2 mm)	Nb moyen**
11/05/2022	Boyard	17,9	33,1	218 790 ↗	26815	6 750 ↗	13123	210 ↗	3195
	Trompe-Sot	19,6	32,2	40 470 ↗	2168	990 ↗	1293	90 ↘	283

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

** Suivi des larves : Moyenne des quantités de larves observées Pour la même période considérée sur le site de Boyard (2005-2021) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2021), pour 1,5m³


Les flèches ↗↘↔ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves



Appréciation sur l'ensemble de la saison (février à juillet), basée sur les résultats sur Boyard depuis 2006.

Évolution de la température et de la salinité de l'eau



Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (g/l, ou ‰) sur le site de Boyard et Trompe-Sot, comparées aux références : moyennes de 2005 à 2021.



La salinité est stable, proche de la normale de saison.

La température de l'eau est en hausse, au-dessus de la normale de saison (en moyenne : +3,8°C).

Commentaires

- ⇒ **Boyard :**
 - Quantité très importante de larves au stade Petites ;
 - Quantité importante de larves au stade Moyennes
 - Quantité faible de larves au stade Grosses ;
- ⇒ **Trompe - Sot :**
 - Quantité importante de larves au stade Petites ;
 - Faibles quantités de larves aux stades Moyennes et Grosses.

Évolution des quantités de larves



Quantités de larves aux stades « Petites », « Moyennes » et « Grosses », observées en 2022 et moyennes de référence (« Petites » et « Grosses ») observées pour la même période sur le site de Boyard (2005-2021) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2021), pour 1,5m³.