




Date	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité * -1m (‰)	Quantités de larves pour 1,5 m ³					
				Petites (<0,11 mm)	Nb moyen**	Moyennes (0,11 à 0,2 mm)	Nb moyen**	Grosses (> 0,2 mm)	Nb moyen**
24/05/2022	Boyard	18,0	33,6	9 345 ↘	5566	4 445 ↗	4407	700 ↗	1566
	Trompe-Sot	19,0	33,6	2 350 ↘	4383	2 000 ↗	1426	400 ↗	648

* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

** Suivi des larves : Moyenne des quantités de larves observées Pour la même période considérée sur le site de Boyard (2005-2021) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2021), pour 1,5m³


Les flèches ↗↘↔ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves



Appréciation sur l'ensemble de la saison (février à juillet), basée sur les résultats sur Boyard depuis 2006.

Évolution de la température et de la salinité de l'eau





Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (g/l, ou ‰) sur le site de Boyard et Trompe-Sot, comparées aux références : moyennes de 2005 à 2021.

La salinité est stable, toujours supérieure à la normale de saison (+1‰, avec une normale à 32,5‰ à cette période). La température de l'eau est au-dessus de la normale de saison (en moyenne : +2,6°C).

Commentaires

- ⇒ **Boyard :**
 - Quantités importantes de larves aux stades Petites et Moyennes ;
 - Quantité modérée de larves au stade Grosses ;
- ⇒ **Trompe - Sot :**
 - Quantités modérées de larves aux 3 stades : Petites, Moyennes et Grosses.

Évolution des quantités de larves



Quantités de larves aux stades « Petites », « Moyennes » et « Grosses », observées en 2022 et moyennes de référence (« Petites » et « Grosses ») observées pour la même période sur le site de Boyard (2005-2021) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2021), pour 1,5 m³.