

Date	Lieu de prélèvement	Température -1m (°C)	Salinité * -1m (‰)	Quantités de larves pour 1,5 m ³					
				Petites (<0,11 mm)	Nb moyen**	Moyennes (0,11 à 0,2 mm)	Nb moyen**	Grosses (> 0,2 mm)	Nb moyen**
15/05/2023	Boyard	15,2	34,3	31 740 ↘	9357	25 730 ↗	7472	2 550 ↗	3891
	Trompe-Sot	15,7	33,8	6 340 ↗	6378	4 580 ↗	1865	520 ↘	681


* Salinité de référence de l'eau de mer, Océan Atlantique = 35‰.

** Suivi des larves : Moyenne des quantités de larves observées

Pour la même période considérée sur le site de Boyard (2005-2022) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2022), pour 1,5m³


Les flèches ↗↘↔ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.

Appréciation des quantités de larves



Appréciation sur l'ensemble de la saison (février à juillet), basée sur les résultats sur Boyard depuis 2006.

Évolution de la température et de la salinité de l'eau



Évolution de la température de l'eau (°C) et de la salinité (g/l, ou ‰) sur le site de Boyard et Trompe-Sot, comparées aux références : moyennes de 2005 à 2022.

La salinité sur les deux sites est au-dessus de la moyenne de référence (+1,5‰ en moyenne).

La température de l'eau est proche de la normale de saison.

Commentaires



⇒ Boyard :

- Fortes quantités de larves aux 3 stades Petites, Moyennes et Grosses.

⇒ Trompe - Sot :

- Fortes quantités de larves aux stades Petites et Moyennes
- Quantité modérée de larves au stade Grosses.

Évolution des quantités de larves



Quantités de larves aux stades « Petites », « Moyennes » et « Grosses », observées en 2023 et moyennes de référence (« Petites » et « Grosses ») observées pour la même période sur le site de Boyard (2005-2022) et le site de Trompe-Sot (2011 à 2022), pour 1,5 m³.